

ADENOTOMIE (odstranění nosních mandlí)

Nosní madle (adenoidní vegetace) je lymfatická tkáň uložená v nosohltanu (za měkkým patrem a není tedy viditelná při běžném pohledu do krku).

Důvody k odstranění zvětšené nosní madle (indikace k adenotomii):

- ztížené dýcháním nosem
- noční chrápání, dýchání ústy, huhňavost
- opakující se rýmy, kašel
- opakující se záněty středního ucha, nedoslýchavost
- celkové příznaky – únava, nechutenství, noční pomočování a další

Operace:

- provádí se v celkové narkóze
- po odtažení měkkého patra se odstraňuje tkáň nosní mandle pomocí nástroje (kyrety) za kontroly optikou, což umožňuje přesné provedení výkonu (viz. endoskopické operace v oblasti horních cest dýchacích)
- v případě nedoslýchavosti dítěte, která je obvykle způsobená tekutinou za bubínkem, provádíme protětí bubínku s odsátím sekretu a popřípadě zavedení ventilační trubičky (viz. zavedení ventilační trubičky do bubínku)

V pooperačním období sledujeme, zda dítě nekrváčí a zřídka podáváme léky proti bolesti. Druhý den je dítě po ranní kontrole lékařem propuštěno do domácího léčení. Doporučujeme týden tělesný klid, pobyt mimo dětský kolektiv a tři dny měkkou stravu. V případě krvácení z nosu či úst neodkladnou kontrolu na ORL oddělení.

Podrobnější informace si vyžádejte u ORL lékaře.